



La única opción segura y eficaz
para controlar hormigas domiciliarias



Boroglex

No hay reina que se resista.





Boroglex

Cebo en gel

Ácido Bórico 2 %.



PRESENTACIÓN

Envase: Jeringa de 30 y 60 gramos.

Pomo aplicador de 250 gramos.

INSCRIPCIÓN INAL N° 0250022

ASPECTOS RELEVANTES

El Ácido Bórico es un compuesto que en baja concentración posee un excelente efecto insecticida, y al mismo tiempo, resulta sumamente seguro para personas o animales. El ácido bórico posee efecto corrosivo sobre tracto digestivo de las hormigas. Una vez ingerido el cebo, se produce una ruptura de membrana en células del epitelio gástrico, favoreciendo el desbalance osmótico y la deshidratación de los insectos

¿QUE CONTROLA?

Sumamente eficaz para control de hormigas melívoras que alimentan crías y congéneres mediante trofalaxis (regurgitación de alimento y pasaje de boca a boca). Estas hormigas pueden ser de interior o exterior, por ejemplo: hormiga carpintera (*Camponotus mus*), hormiga argentina (*Linepithema humile*), hormiga cabezona (*Pheidole spp.*), hormiga del pavimento (*Tetramorium spp.*), hormiga faraón (*Monomorium pharaonis*), hormiga de fuego (*Solenopsis spp.*), etc.

¿DONDE SE APLICA?

Puede aplicarse en interiores y/o exteriores según la especie de hormiga. Por tratarse de un formulado con baja concentración de ingrediente activo, puede ser utilizado en sitios donde la presencia de personas o animales es inevitable. Casas, escuelas, hospitales, restaurantes, industrias en general, instalaciones deportivas, granjas, tambos, depósitos y áreas verdes en general, barrios cerrados, plazas, campos de golf, etc.

BUEN USO

Para obtener los mejores resultados utilizando **BOROGLEX®** es fundamental identificar la especie de hormiga, su hábitat y lugares de tránsito. Por otro lado, deben considerarse los siguientes aspectos:

- Identificar el ingreso al hormiguero.
- Limpiar o eliminar cualquier fuente de alimento que pueda generar competencia con el cebo.
- En interior o exterior colocar el cebo dentro de algún contenedor (cebaderas) que permita el libre acceso de las hormigas.
- Ubique el cebo lo mas cerca del ingreso al hormiguero que pueda. Nunca coloque el cebo dentro.
- Realice aplicaciones focalizadas. Una vez que las hormigas se estén alimentando en un sitio, no movilice la cebadera.
- Monitorear frecuentemente el consumo de cebo y reponer en la medida que sea necesario.
- En exterior, evitar que el cebo quede expuesto a la intemperie y se degrade o deteriore por acción del sol o lluvia.
- Evitar el contacto innecesario del producto con alimentos, utensilios de cocina, juguetes, etc.

DOSIS DE USO

Independientemente de la especie de hormiga a controlar, la dosis de referencia equivale a 5-10 gramos por punto de cebado. La cantidad de puntos de cebado dependerá de la densidad de hormigas visualizadas y la cantidad de hormigueros identificados. Generalmente resulta suficiente disponer solo una cebadera por hormiguero. Es importante reponer el cebo en la medida que la cebadera se vacíe.

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR
DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

