



PARA EL CONTROL DE HORMIGAS CORTADORAS

Composición:	
sulfuramida: N - etil - perfluorooctano	
sulfuramida	0,3 g.
inertes c.s.p.	100 g.



LEA INTEGRAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA - con el N° 00399

Industria Argentina

Fecha de Vencimiento:

Ver en el envase

ARIPA S.R.L.

Cerrito 1133 (B1714ARC) -Ituzaingo - Pcia.de Bs.As. Argentina

NO INFLAMABLE

Partida N°: Ver en el envase

Cont. Neto: Ver en el envase

PRECAUCIONES: MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. DESTRUYA LOS ENVASES VACÍOS. NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Durante la aplicación usar guantes y botas de goma, ropa protectora apropiada y mascarilla para polvos. No comer, beber ni fumar durante la aplicación. No tocar el producto con las manos desnudas. Finalizado el tratamiento lavarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

RIESGOS AMBIENTALES: Producto ligeramente tóxico para ABEJAS. Ligeramente tóxico para AVES y PECES.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: El sobrante de su aplicación debe ser guardado en su envase original cerrándolo para evitar el humedecimiento del mismo.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Perfore el envase vacío provocando su destrucción para evitar su reuso en otros menesteres.

ALMACENAMIENTO: Debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar fresco, ventilado y seguro, a cubierto de los rayos solares, lejos del fuego, alimentos y fuera de la casa.

DERRAMES: Barrer y tratar de aplicarlo nuevamente en el combate de hormigas. Luego, si el piso es firme, lave con abundante agua el lugar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, provocar el vómito mediante la ingestión de 1 ó 2 vasos de agua salada tibia y/o estimulaciones de fauces (dedos en la garganta). No provocar el vómito a una persona inconsciente. Por contacto de ojos, lavar el área afectada prolijamente. Exposición inhalatoria, retirarse a un lugar aireado.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO: CLASE IV.

En caso de ingestión, provocar el vómito con jarabe de Ipeca o realizar lavage gástrico; luego suministrar carbón activado y posteriormente dar purgante salino u osmótico. Controlar al paciente por 72 hs.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Ciudad de Bs. As.: Centro Toxicológico del Hospital de Niños de Buenos Aires, Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-2247 / 6666 - Hospital de Clínicas de Buenos Aires - Gral. San Martín: Tel. (011) 5950-8000 - Int. 8004. - Pcia de Bs. As.: Centro Nac. de Intoxicaciones, Policlínico Posadas (Haedo): Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777 - La Plata: Hospital de Niños: Tel. (0221) 4535901/09 - Int. 1312/09 - Rosario: Centro de Toxicología TAS: Tel. (0341) 424-2727 / 448-0077 - Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 422-2039 - Mendoza: Hospital Regional: Tel. (0261) 420-0600 / 2653 / 0714 / 4800 - Neuquén: Hospital Regional: Tel. (0299) 4413474 / 79 - Chaco: Hospital J. C. Perrando: Tel. (03722) 425050 / 427233.

GENERALIDADES: MAMBORETÁ MIREX-S es un insecticida a base de SULFLURAMIDA para controlar hormigas cortadoras de los géneros Atta y Acromyrmex. Su acción es lenta (3 a 5 días) pero por esa causa no es rechazado por las hormigas. Puede ser aplicado en cualquier época del año.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación: MAMBORETÁ MIREX-S se aplica tal cual, no requiere preparación previa alguna.

Métodos de aplicación: Aplicar el MAMBORETÁ MIREX-S directamente del envase, sin contacto manual, a lo largo de los caminos activos y en la proximidad de las bocas activas del hormiguero. No colocar gránulos dentro de las bocas, pues el producto deber ser cargado por las hormigas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Epoca de aplicación: Se recomienda aplicarlo al atardecer, cuando el transporte del cebo por las hormigas podrá ser efectuado sin interrupción, incluso durante la noche. **DOSIS:** 1°) Hormiga minera (*Atta sexdens*); *Hormiga isau* (*Atta vollenweideri*): **6 a 10 gramos /m²** de tierra suelta del hormiguero. Nota: para el cálculo del área de tierra suelta, localizar la sede del hormiguero y multiplicar el mayor ancho en metros de la sede. 2°) Hormiga negra común (*Acromyrmex lundi*); Hormiga negra del sur (*Acromyrmex lobicornis*), Hormiga colorada (*Acromyrmex striatus*); Hormiga invasora (*Iridomyrmex humilis*): **6 a 50 gramos / hormiguero**, según su tamaño.

Si desea volúmenes mayores, deberá tener en cuenta estas relaciones de equivalencia: 1 cucharada de postre = 8 gramos / 1 cucharada sopera = 11 gramos.

Frecuencia: Normalmente una sola aplicación de MAMBORETÁ MIREX-S de acuerdo con las indicaciones es suficiente para el control efectivo. No obstante, de haber necesidad de repasar, hacerlo 60 - 90 días después de la primera aplicación.

Contraindicaciones: No aplicar en días lluviosos o en proximidad de lluvias, para evitar el humedecimiento de los cebos. **No aplicar sobre suelo húmedo.**

COMPATIBILIDAD: Siendo un cebo granuloso activo, el MAMBORETÁ MIREX-S no debe ser aplicado junto con otros productos.


RESTRICCIONES DE USO: No presenta. El producto no se aplica directamente sobre los cultivos.

IMPORTANTE: Por no estar la aplicación ni el almacenaje bajo su supervisión directa, ARIPA S.R.L. no se responsabiliza por los daños, accidentes o resultados insatisfactorios que pudieran derivar de un uso incorrecto o distinto del prescrito en este folleto.

En Huertas  y Jardines

Mamboretá

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:

 Tel./Fax: (011) 4621-7723

 E-mail: info@mamboreta.com.ar

 www.mamboreta.com.ar

 Cerrito 1133 (B1714ARC) -Ituzaingo - Provincia de Buenos Aires - Argentina



CUIDADO



CUIDADO