HERBICIDA

Mamboretá

CONCENTRADO SOLUBLE

SELECTIVO

LINEA JARDIN

Composición:

M.C.P.A.: sal sódica del ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético.....28 g *
Materias inertes c.s.p.....100 cm^3

* equivalente en ácido 2-mentil-clorofenoxiacético.....25,2 gramos

LEA INTEGRAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUDY AL AMBIENTE.

Inscripto en SENASA - con el N° 00317
INDUSTRIA ARGENTINA
Fecha de Vencimiento:
Ver en el envase

No Inflamable
Cont. Neto: Ver en el envase
Partida N°: Ver en el envase

ARIPA S.R.L.

Cerrito 1133 – (B1714ARC) Ituzaingó - Pcia. de Bs. As. - Argentina

PRECAUCIONES:

NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. DESTRUYA LOS ENVASES VACIOS.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

Evitar la ingestión, inhalación, contacto con la piel u ojos y la contaminación de los alimentos. Usar anteojos de protección, guantes, pantalones largos, remera con mangas largas durante la aplicación.

Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa de trabajo. No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con agua y jabón después de la aplicación.

Luego de usar, lavar bien la pulverizadora inmediatamente después de su uso y antes de emplearlas con insecticidas o fungicidas.

RIESGOS AMBIENTALES: VIRTUALMENTE NO TOXICO para ABEJAS. PRÁCTICAMENTE NO TOXICO para ORGANISMOS ACUÁTICOS. PRÁCTICAMENTE NO TOXICO para AVES.

DERRAMES: En caso de derrames del producto, cubrir con material absorbente (tierra, aserrín, etc.). Barrer y enterrar en un lugar que no contamine fuentes de agua. Lave el área contaminada con abundante agua.

ALMACENAMIENTO: Conservar en los envases originales, bien cerrados, en lugares secos, frescos y alejados de los alimentos.

METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES: ESTE ENVASE VACÍO NUNCA DEBE SER REUTILIZADO. DESTRUIR POR ROTURA O COMPACTACIÓN.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, administrar papilla de carbón activado con agua cada 20 minutos. Por salpicaduras en piel lavar con abundante agua y jabón (no detergente). Por salpicaduras en ojos enjuagar con abundante agua limpia durante 15 minutos. **LLAMAR AL MEDICO**

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: PRODUCTO POCO PELIGROSO: CLASE III. MODERADO IRRITANTE OCULAR - LEVE IRRITANTE DERMAL.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Ciudad de Bs. As.: Centro Toxicológico del Hospital de Niños de Buenos Aires, Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-2247 / 6666 - Hospital de Clínicas de Buenos Aires Gral. San Martín: Tel. (011) 5950-8000 - Int. 8004 - **Pcia de Bs. As.:** Centro Nacional de Intoxicaciones, Policlínico Posadas (Haedo): Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777 - **La Plata:** Hospital de Niños: Tel. (0221) 4535901/09 - Int. 1312/09 - **Rosario:** Centro de Toxicología TAS: Tel. (0341) 424-2727/ 448-0077 **Córdoba:** Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 422-2039 - **Mendoza:** Hospital Regional: Tel. (0261) 420-0600 / 2653 / 0714 / 4800 - **Neuquén:** Hospital Regional: Tel. (0299) 4413474 / 79 - **Chaco:** Hospital J. C. Perrando: Tel. (03722) 425050 / 427233.

GENERALIDADES:

El herbicida **Mamboretá SELECTIVO** preparado como liquido soluble en agua es recomendado para el control de malezas de hoja ancha en céspedes de parques, jardines, canchas de golf, fútbol, etc.

No es fitotóxico si se lo usa a la dosis y en la forma recomendada.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación de la dilución: mezclar la dosis a utilizar de **Mamboretá SELECTIVO** con un poco de agua y agitar. Luego agregar el agua restante hasta alcanzar el volumen total agitando siempre fuertemente. Utilizar la emulsión de inmediato, no dejar el producto preparado de un día para el otro.

Equipos de aplicación: en explotaciones reducidas, puede aplicarse con cualquier máquina pulverizadora, sea manual o a motor. Puede aplicarse también con una regadera de “flor fina”. Cubrir bien el follaje a tratar, pulverizando hasta punto de goteo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Aplicarlo en las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde. Asegurar una distribución uniforme del herbicida sobre la superficie a tratar. Las malezas deben estar en activo crecimiento con una buena humedad en el suelo. No aplicar en épocas de sequía y suspender el riego por tres días después del tratamiento. En primavera-verano se recomienda realizar más de un tratamiento para el control de algunas malezas que puedan aparecer como causa de semillas germinadas después del tratamiento.

MALEZAS QUE SE CONTROLAN CON UN SOLO TRATAMIENTO

Cardo asnal (Silybum marianum); **Cardo negro** (Circium vulgare); **Cardo ruso** (Salsola kali); **Cardo pendiente** (Carduus thoermeri); **Cepa caballo** o **Abrojo chico** (Xanthium spinosum); **Diente de león** (Taraxacum officinale); **Girasol guacho** (Heliantus annuus); **Girasolillo** o **Santa María** (Verbesina encelioides); **Lengua de vaca** (Rumex crispus); **Mastuerzo** (Coronopus didymus); **Mostacilla** (Rapistrum rugosum); **Mostaza** (Brassica spp.); **Nabo** (Brassica campestris); **Nabón** (Raphanus sativus); **Quinoa** (Chenopodium spp.).

MALEZAS QUE SE CONTROLAN CON MÁS DE UN TRATAMIENTO

Abrojo grande (Xanthium cavanillesii); **Abrepuño** (Centaurea melitensis); **Abrepuño amarillo** (Centaurea solstitalis); **Abrepuño colorado** (Centaurea calcitrapa); **Campanilla** o **Correhuela** (Convulvulus arvensis); **Cerraja** (Sonchus oleraceus); **Cicuta** (conium maculatum); **Chamico** (Datura ferox); **Falsa biznaga** (Ammi majus); **Huevo de gallo** (Salpichroa origanifolia); **Ortiga** (Urtica urens); **Yuyo sapo** o **Sunchillo** (Wedelia glauca).

DOSIFICACIÓN:

Este envase va acompañado de una medida graduada para dosificar con capacidad de 10 cm^3. Agregar 20 a 40 cm^3 de **Mamboretá SELECTIVO** en 10 litros de agua limpia y pulverizar 100 m^2. La dosis mayor se empleará cuando las malezas estén en un mayor estado de desarrollo.

RESTRICCIONES DE USO:

Debe evitarse que el líquido pulverizado llegue a cultivos sensibles como FRUTALES, HORTALIZAS, FLORES, ARBOLES Y ARBUSTOS ORNAMENTALES. La OREJA DE RATÓN (Dichondra sp.), TREBOLES y otras LEGUMINOSAS, aunque se reponen, son afectadas por este producto, por lo que debe evitarse su aplicación si predominan estas especies en el césped a tratar.

COMPATIBILIDAD:

No aplicar con otros productos.

FITOTOXICIDAD:

A las dosis y en los cultivos recomendados, no presenta.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: consulte su aplicación con un Ingeniero Agrónomo

IMPORTANTE:

Por no estar la aplicación ni el almacenamiento bajo su supervisión directa, ARIPA S.R.L., no se responsabiliza por los daños, accidentes, o resultados insatisfactorios que pudieran derivar de un uso incorrecto o distinto del prescripto en este folleto.

En Huertas y Jardines

Mamboretá

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:

Tel./Fax: (011) 4621-7723

E-mail: info@mamboreta.com.ar

www.mamboreta.com.ar

Cerrito 1133 – (B1714ARC) Ituzaingó
Provincia de Buenos Aires - Argentina

CUIDADO

CUIDADO